

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Toprak/Yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilmektedir.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alanlarda kullanınız.
- Uygulama esnasında maske, eldiven, gözlük takınız ve koruyucu elbise giymeniz önerilir.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar ile kullanmayıp imha ediniz.
- Güneşin etkisinin düşük olduğu sabah/akşam saatlerinde yaprakтан uygulanması tavsiye edilir.

KARİŞİBİLİRLİK

- Ürün, fizyolojik asit reaksiyonlu olan diğer ürünlerle ile birlikte güvenle karıştırılarak uygulanabilir.
- Ancak, bilinmeyen diğer preparatlar ile karıştırılabilirliğindeki fiziksel uyumluluk için kavanoz testi ile yapılması önerilir.
- Kalsiyum içeren diğer bileşiklerle birlikte karıştırılarak uygulanmamalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

- Ürün, orijinal ambalajında kapağı kapalı olarak +5 ile +25°C arasında, serin ve kuru alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürün, gıdalar, su kaynakları ve hayvan yemlerinden uzak, terchen ahşap ızgara üzerinde, iyi havalandırılan alanlarda depolanmalıdır.
- Bu koşullarda saklandığında, ürün 3 yıl süreyle fiziksel ve kimyasal özelliklerini korur.

FİRMA BEYANI

- Ürün, üretici firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürün kalitesini garanti eder.
- Gübrenin kullanımı üretici firmanın kontrolü dışında olduğu için, etiket üzerinde yer alan bilgiler yalnızca laboratuvar analiz sonuçları ile sınırlıdır.
- Hatalı kullanım, yanlış karışım veya uygun olmayan depolama koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar, üretici firmanın sorumluluğu dışındadır.

TAAHHÜT

- Piyasaya sunulan ürünün içeriği ve etiket bilgileri, alınan tescil belgelerindeki değerler ile aynıdır. Aksinin ispatı halinde, Türkiye Cumhuriyetinin 7223 sayılı kanun kapsamında tarafımıza uygulanacak yasal yaptırımları kabul ederiz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yapraktan Uygulama:

OrganoPlantis PhosPro, asidik reaksiyonlu bir gübredir. Ancak yaprakтан uygulamalarda kullanılan suyun çok sert (kireçli) veya yüksek pH'lı olması durumunda, çözeltinin pH'sı mutlaka 5,0-5,5 aralığına ayarlanmalıdır. Bu pH aralığı yaprakтан besin maddesi absorpsiyonunun en yüksek olduğu değer aralığıdır. Bunun için, çözeltinin hazırlanmasında şu sıra izlenmelidir:

- Öncelikle, 100 litre suya 50-75 ml KalsiBalance gibi asidik çözelti ilave edilerek karıştırılır.
- Ardından, yaprakтан uygulama için tavsiye edilen dozda NitroMax çözeltiye eklenir ve iyice karıştırılır.
- Uygulama, güneş ışığının etkisinin düşük olduğu sabah erken veya akşam serin saatlerde yapılmalıdır.

Bu yöntem, gübrelere yaprakтан alım etkinliğini artırır ve bitkinin beslenmesini en üst düzeye çıkarır.

Toprakтан Uygulama Şekli

- **Damla Sulama Sistemi ile:** Tavsiye edilen toprakтан uygulama dozu, dekara 1 ton (1000 L) su ile verilmelidir. Özellikle fide sonrası ve hızlı vejetatif büyüme dönemlerinde uygulanmalıdır.
- **Pivot Sulama ile:** Tavsiye edilen toprakтан uygulama dozu esas alınarak dekara uygulanır. Kardeşlenme - sürgün gelişimi dönemlerinde tercih edilmelidir.
- **Yağmurlama ile:** Tavsiye edilen toprakтан uygulama dozu, dekara 600-800 L su ile uygulanmalıdır. Özellikle aktif vejetatif gelişim süresince uygulanmalıdır.
- **Sulama Altyapısı Bulunmayan Arazilerde:** Motopomp, sırt pülverizatörü, tanker veya sulama kanalı yardımıyla uygulanabilir. Traktör arkası ilaçlama makineleriyle, dekara tavsiye edilen uygulama dozu 80-100 L suya karıştırılarak arazi yüzeyine veya kök boğazına püskürtülerek uygulanabilir. Sulama öncesi veya sonrası doğrudan kök boğazına da verilebilir.

Seralarda Uygulama

- Seralarda Topraklı Yetiştiricilikte Kullanımı: Seralarda topraklı yapılan yetiştiriciliklerde toprakтан uygulanacak toplam miktar 2 kat artırılmalı, kullanılması gereken miktar sulama sıklığı ve sayısına göre bölünerek uygulanmalıdır. Bitkinin fenolojik durumuna bağlı olarak yapılacak gübre değişikliklerinde, gübrenin tabloda verilen uygulama zamanının toplam vejetasyon süresi içerisindeki % payı dikkate alınarak toplam uygulanacak miktar azaltılmalıdır.
- Seralarda Topraksız Yetiştiricilikte (Hidroponik Sistem) Kullanımı: Seralarda substrat kültürü veya su kültürü gibi hidroponik sistemlerde toprakтан uygulanacak toplam miktar 3 kat artırılmalı, besin çözeltisi konsantrasyonu dikkate alınarak, EC ve pH değerleri izlenmeli ve buna göre uygulama yapılmalı, kullanılması gereken miktar sulama sıklığı ve sayısına göre bölünerek uygulanmalıdır. Bitkinin fenolojik durumuna bağlı olarak yapılacak gübre değişikliklerinde, gübrenin tabloda verilen uygulama zamanının toplam vejetasyon süresi içerisindeki % payı dikkate alınarak toplam uygulanacak miktar azaltılmalıdır.



Organomineral Ürünler NPK'lı Sıvı Organomineral Gübre OrganoPlantis PhosPro

Garanti Edilen İçerik	%(w/v)	Garanti Edilen İçerik	%(w/v)
Organik Madde	10	Suda Çözünabilir Kükürt Trioksit (SO ₃)	5
Organik Karbon	4	Suda Çözünabilir Magnezyum Oksit (MgO)	2
Serbest Aminoasitler	1	Suda Çözünabilir Demir (Fe)	0,50
Total Azot (N)	5	Suda Çözünabilir Bakır (Cu)	0,05
- Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	3	Suda Çözünabilir Çinko (Zn)	0,25
- Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	1	Suda Çözünabilir Mangan (Mn)	0,20
- Organik Azot	1	Suda Çözünabilir Bor (B)	0,10
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	15	Argilik Asit	0,01
- Suda Çözünabilir Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	15	Maksimum Klor (Cl)	1
Suda Çözünabilir Potasyum Oksit (K ₂ O)	5	pH	4-6



FİRMA: OrganoPlantis

Organo Plantis MMC

Resid Behbudov 59, AF City Business Center, 7.kat 1726 No'lu ofis, Bakü Azərbaycan
info@organoplantis.com.tr www.organoplantis.com



ECOBİGEN
"Üretim ve Pazarlama"

Ecobigen Gübre, Tarım, Gıda Tic.San.Ltd.Şti.

Alparslan Mah. Samsun 1. Sok. No:13, Bafra, Samsun, Türkiye

Net Hacim: 1 litre

/ Kullanmadan önce çalkalayınız. /



KULLANIM AMACI / ÜRÜN TANIMI

OrganoPlantis PhosPro, bitkilerin kök gelişimi, çiçeklenme ve meyve tutumu gibi kritik evrelerinde artan fosfor (P) ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiş sıvı organomineral gübredir. Dengeli N-P-K yapısına ek olarak mikroelementler (Fe, Zn, Cu, Mn, B), serbest amino asitler ve argilic asit içerir. Bu özel formül, bitkide enerji metabolizmasını güçlendirir, çiçeklenme ve meyve tutumunu destekler, stres koşullarına karşı dayanıklılığı artırır. Düzenli kullanımda ürün verimi ve kalite parametrelerinde artış sağlar.

Bitki Grubu	Toprakтан Uygulama l / dekar	Yapraktan Uygulama ml / dal	Uygulama Zamanı
Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik vb.)	45-50	450-500	Kardeşlenme ve özellikle sapa kalkma öncesinde kök ve dane tutumunu desteklemek için 2 uygulama
Mısır, Ayçiçeği	45-50	450-500	Çıkış sonrası hızlı kök gelişimi ve sapa kalkma öncesinde 2 uygulama
Pamuk	45-50	450-500	Çıkış sonrası ve çiçeklenme öncesinde 2 uygulama
Patates, Havuç, Şeker Pancarı	40-45	400-450	Çıkış sonrası kök gelişimi, yumru/tuber oluşumu başlangıcında 2 uygulama
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Mercimek)	45-50	450-500	Çıkış sonrası kök gelişimi ve çiçeklenme öncesinde 2 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Nar, Vişne, Şeftali, Erik, Ayva, Kiraz vb.)	40-45	400-450	Çiçeklenme öncesi ve meyve tutumu başlangıcında 2 uygulama
Muz, Zeytin	35-40	350-400	İlk baharda aktif kök gelişimi ve çiçeklenme öncesinde 1-2 uygulama
Narenciye (Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt, Ahlatı)	35-40	350-400	İlk bahar sürgün gelişimi ve çiçeklenme öncesinde 1-2 uygulama
Sert Kabuklu Meyve Ağaçları (Fındık, Ceviz, Badem, Antep Fıstığı vb.)	40-45	400-450	Çotanak bağlamadan önce ve döllenme sonrası 2 uygulama
Bağ, Kivi	40-45	400-450	İlk baharda sürgün gelişimi ve çiçeklenme öncesinde 2 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak vb.)	35-40	300-350	Fide sonrası kök gelişimi ve çiçeklenme öncesinde 2-3 uygulama
Yaprak Yenen Sebzeler (Marul, Lahana, Ispanak vb.)	45-50	450-500	Bitki boyu 8-10 cm olduğunda başlayarak, yaprak büyüme süresince 2 uygulama
Çilek	40-45	400-450	Yaprak ve sürgün gelişiminde, ayrıca çiçeklenme öncesinde 2-3 uygulama
Yeşil Alanlar, Çim ve Kesme Çiçekçilik	45-50	450-500	Gelişim sezonu boyunca 15-20 günde bir uygulanır

10 dekar (da) = 1 hektar (ha)

* Toprakтан uygulanacak miktar uygulama sayısına bölünerek verilmelidir.

* Bitkinin fenolojik durumuna göre gübre değişikliği yapılması durumunda kullanılacak gübre miktarında 1/2 oranında azaltma yapılabilir.

Parti No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

