

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Toprak/Yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilmektedir.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alanlarda kullanınız.
- Uygulama esnasında maske, eldiven, gözlük takınız ve koruyucu elbise giymeniz önerilir.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar ile kullanmayıp imha ediniz.
- Güneşin etkisinin düşük olduğu sabah/akşam saatlerinde yaprakтан uygulanması tavsiye edilir.

KARİŞİBİLİRLİK

- Ürün, fizyolojik asit reaksiyonlu olan diğer ürünlerle ile birlikte güvenli karıştırılarak uygulanabilir.
- Ancak, bilinmeyen diğer preparatlar ile karıştırılabilirliğindeki fiziksel uyumluluk için kavanoz testi ile yapılması önerilir.
- Kalsiyum içeren diğer bileşiklerle birlikte karıştırılarak uygulanmamalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

- Ürün, orijinal ambalajında kapağı kapalı olarak +5 ile +25°C arasında, serin ve kuru alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürün, gıdalar, su kaynakları ve hayvan yemlerinden uzak, terchen ahşap ızgara üzerinde, iyi havalandırılan alanlarda depolanmalıdır.
- Bu koşullarda saklandığında, ürün 3 yıl süreyle fiziksel ve kimyasal özelliklerini korur.

FİRMA BEYANI

- Ürün, üretici firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürün kalitesini garanti eder.
- Gübrenin kullanımı üretici firmanın kontrolü dışında olduğu için, etiket üzerinde yer alan bilgiler yalnızca laboratuvar analiz sonuçları ile sınırlıdır.
- Hatalı kullanım, yanlış karışım veya uygun olmayan depolama koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar, üretici firmanın sorumluluğu dışındadır.

TAAHHÜT

- Piyasaya sunulan ürünün içeriği ve etiket bilgileri, alınan tescil belgelerindeki değerler ile aynıdır. Aksinin ispatı halinde, Türkiye Cumhuriyetinin 7223 sayılı kanun kapsamında tarafımıza uygulanacak yasal yaptırımları kabul ederiz.

UYGULAMA ŞEKLİ

■ Yapraktan Uygulama:

OrganoPlantis KaliForce, asidik reaksiyonlu bir gübredir. Ancak yaprakтан uygulamalarda kullanılan suyun çok sert (kireçli) veya yüksek pH'lı olması durumunda, çözeltinin pH'sı mutlaka 5,0-5,5 aralığına ayarlanmalıdır. Bu pH aralığı yaprakтан besin maddesi absorpsiyonunun en yüksek olduğu değer aralığıdır. Bunun için, çözeltinin hazırlanmasında şu sıra izlenmelidir:

- Öncelikle, 100 litre suya 50-75 ml KalsiBalance gibi asidik çözelti ilave edilerek karıştırılır.
- Ardından, yaprakтан uygulama için tavsiye edilen dozda NitroMax çözeltiye eklenir ve iyice karıştırılır.
- Uygulama, güneş ışığının etkisinin düşük olduğu sabah erken veya akşam serin saatlerde yapılmalıdır.

Bu yöntem, gübrelere yaprakтан alım etkinliğini artırır ve bitkinin beslenmesini en üst düzeye çıkarır.

■ Toprakтан Uygulama Şekli

- **Damlalı Sulama Sistemi ile:** Tavsiye edilen toprakтан uygulama dozu, dekara 1 ton (1000 L) su ile verilmelidir. Özellikle fide sonrası ve hızlı jejetatif büyüme dönemlerinde uygulanmalıdır.
- **Pivot Sulama ile:** Tavsiye edilen toprakтан uygulama dozu esas alınarak dekara uygulanır. Kardeşlenme - sürgün gelişimi dönemlerinde tercih edilmelidir.
- **Yağmurlama ile:** Tavsiye edilen toprakтан uygulama dozu, dekara 600-800 L su ile uygulanmalıdır. Özellikle aktif jejetatif gelişim süresince uygulanmalıdır.
- **Sulama Altyapısı Bulunmayan Arazilerde:** Motopomp, sırt pülverizatörü, tanker veya sulama kanalı yardımıyla uygulanabilir. Traktör arkası ilaçlama makineleriyle, dekara tavsiye edilen uygulama dozu 80-100 L suya karıştırılarak arazi yüzeyine veya kök boğazına püskürtülerek uygulanabilir. Sulama öncesi veya sonrası doğrudan kök boğazına da verilebilir.

■ Seralarda Uygulama

- Seralarda Topraklı Yetiştiricilikte Kullanımı: Seralarda topraklı yapılan yetiştiriciliklerde toprakтан uygulanacak toplam miktar 2 kat arttırılmalı, kullanılması gereken miktar sulama sıklığı ve sayısına göre bölünerek uygulanmalıdır. Bitkinin fenolojik durumuna bağlı olarak yapılacak gübre değişikliklerinde, gübrenin tabloda verilen uygulama zamanının toplam yetiştirme süresi içerisindeki % payı dikkate alınarak toplam uygulanacak miktar azaltılmalıdır.
- Seralarda Topraksız Yetiştiricilikte (Hidroponik Sistem) Kullanımı: Seralarda substrat kültürü veya su kültürü gibi hidroponik sistemlerde toprakтан uygulanacak toplam miktar 3 kat arttırılmalı, besin çözeltisi konsantrasyonu dikkate alınarak, EC ve pH değerleri izlenmeli ve buna göre uygulama yapılmalı, kullanılması gereken miktar sulama sıklığı ve sayısına göre bölünerek uygulanmalıdır. Bitkinin fenolojik durumuna bağlı olarak yapılacak gübre değişikliklerinde, gübrenin tabloda verilen uygulama zamanının toplam yetiştirme süresi içerisindeki % payı dikkate alınarak toplam uygulanacak miktar azaltılmalıdır.



Organomineral Ürünler NPK'lı Sıvı Organomineral Gübre OrganoPlantis KaliForce

Garanti Edilen İçerik	%(w/v)	Garanti Edilen İçerik	%(w/v)
Organik Madde	10	Suda Çözünabilir Kükürt Trioksit (SO ₃)	5
Organik Karbon	4	Suda Çözünabilir Magnezyum Oksit (MgO)	2
Serbest Aminoasitler	1	Suda Çözünabilir Demir (Fe)	0,50
Total Azot (N)	5	Suda Çözünabilir Bakır (Cu)	0,05
- Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	1	Suda Çözünabilir Çinko (Zn)	0,25
- Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	3	Suda Çözünabilir Mangan (Mn)	0,20
- Organik Azot	1	Suda Çözünabilir Bor (B)	0,10
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	5	Argilik Asit	0,01
- Suda Çözünabilir Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	5	Maksimum Klor (Cl)	1
Suda Çözünabilir Potasyum Oksit (K ₂ O)	15	pH	4-6

FİRMA:  OrganoPlantis Organo Plantis MMC

Resid Behbudov 59, AF City Business Center, 7.kat 1726 No'lu ofis, Bakü Azerbaycan
info@organoplantis.com.tr www.organoplantis.com

ÜRETİM YERİ:  ECOBİGEN

"Üretim ve Pazarlama"

Ecobigen Gübre, Tarım, Gıda Tic.San.Ltd.Şti.

Alparslan Mah. Samsun 1. Sok. No:13, Bafra, Samsun, Türkiye

Net Hacim: 1 litre

/ Kullanmadan önce çalkalayınız. /



KULLANIM AMACI / ÜRÜN TANIMI

OrganoPlantis KaliForce, bitkilerin meyve büyümesi, renk oluşumu, tat dengesi ve raf ömrü gibi kalite parametrelerini iyileştirmek için geliştirilmiş sıvı organomineral gübredir. Yüksek potasyum (K) içeriğine ek olarak azot (N), fosfor (P), mikroelementler (Fe, Zn, Cu, Mn, B), serbest amino asitler ve argillik asit içerir. Bu özel formül, meyve iriliğini ve dolgunluğunu artırırken, stres koşullarında (sıcaklık dalgalanması, tuzluluk, kuraklık) bitkinin dayanıklılığını yükseltir. Düzenli uygulamalarda verimlilik ve pazar değeri yüksek ürünler elde edilmesini sağlar.

Bitki Grubu	Toprakтан Uygulama l / dekar	Yapraktan Uygulama ml / dekar	Uygulama Zamanı
Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik vb.)	45-50	450-500	Başaklanma sonrası dolum döneminde 1-2 uygulama
Mısır, Ayçiçeği	45-50	450-500	Döleme sonrası ve dane doldurma dönemlerinde 2 uygulama
Pamuk	45-50	450-500	Kozalak oluşumu ve dolum dönemlerinde 2 uygulama
Patates, Havuç, Şeker Pancarı	40-45	400-450	Yumur veya kök dolgunlaşma dönemlerinde 2 uygulama
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Mercimek)	45-50	450-500	Çiçeklenme sonrası ve bakla doldurma döneminde 2 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Nar, Vişne, Şeftali, Erik, Ayva, Kiraz vb.)	40-45	400-450	Meyve irileşme ve renk oluşumu dönemlerinde 2 uygulama
Muz, Zeytin	35-40	350-400	Meyve gelişimi ve olgunlaşma dönemlerinde 1-2 uygulama
Narenciye (Portakal, Mandalina, Limon vb.)	35-40	350-400	Meyve irileşme ve kabuk rengi oluşumu dönemlerinde 1-2 uygulama
Sert Kabuklu Meyve Ağaçları (Fındık, Çeviz, Badem, Antep Fıstığı vb.)	40-45	400-450	Çotanak doldurma ve iç dolum dönemlerinde 2 uygulama
Bağ, Kivi	40-45	400-450	Çiçeklenme sonrası meyve tutumu ve olgunlaşma dönemlerinde 2 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak vb.)	35-40	300-350	Meyve irileşme ve olgunlaşma dönemlerinde 2-3 uygulama
Yapraklı Yenen Sebzeler (Marul, Lahana, Ispanak vb.)	45-50	450-500	Hasada 2-3 hafta kala kaliteyi arttırmak için 1 uygulama
Çilek	40-45	400-450	Çiçeklenme sonrası meyve tutumu ve irileşme dönemlerinde 2-3 uygulama
Yeşil Alanlar, Çim ve Kesme Çiçekçilik	45-50	450-500	Yoğun büyüme dönemlerinde 15-20 günde bir uygulanır

10 dekar (da) = 1 hektar (ha)

* Toprakтан uygulanacak miktar uygulama sayısına bölünerek verilmelidir.

* Bitkinin fenolojik durumuna göre gübre değişikliği yapılması durumunda kullanılacak gübre miktarında 1/2 oranında azaltma yapılabilir.

Parti No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

