

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Toprak/Yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilmektedir.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alanlarda kullanınız.
- Uygulama esnasında maske, eldiven, gözlük takınız ve koruyucu elbise giymeniz önerilir.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçları ile kullanmayıp imha ediniz.
- Güneşin etkisinin düşük olduğu sabah/akşam saatlerinde yaprakdan uygulanması tavsiye edilir.

KARIŞILIRLIK

- Ürün, fizyolojik asit reaksiyonu olan diğer ürünlerle ile birlikte güvenle karıştırılarak uygulanabilir.
- Ancak, bilinmeyen diğer preparatlar ile karışılabilirliğindeki fiziksel uyumluluk için kavanoz testi ile yapılması önerilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

- Ürün, orijinal ambalajında kapağı kapalı olarak +5 ile +25°C arasında, serin ve kuru alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürün, gıdalar, su kaynakları ve hayvan yemlerinden uzak, terchen ahşap ızgara üzerinde, iyi havalandırılan alanlarda depolanmalıdır.
- Bu koşullarda saklandığında, ürün 3 yıl süreyle fiziksel ve kimyasal özelliklerini korur.

FİRMA BEYANI

- Ürün, üretici firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürün kalitesini garanti eder.
- Gübrenin kullanımı üretici firmanın kontrolü dışında olduğu için, etiket üzerinde yer alan bilgiler yalnızca laboratuvar analiz sonuçları ile sınırlıdır.
- Hatalı kullanım, yanlış karışım veya uygun olmayan depolama koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar, üretici firmanın sorumluluğu dışındadır.

TAAHHÜT

- Piyasaya sunulan ürünün içeriği ve etiket bilgileri, alınan tescil belgelerindeki değerler ile aynıdır. Aksinin ispatı halinde, Türkiye Cumhuriyetinin 7223 sayılı kanun kapsamında tarafımıza uygulanacak yasal yaptırımları kabul ederiz.

UYGULAMA ŞEKLİ

■ Yapraktan Uygulama:

OrganoPlantis OrganoSoil40, asidik reaksiyonlu bir gübredir. Ancak yaprakdan uygulamalarda kullanılan suyun çok sert (kireçli) veya yüksek pH'lı olması durumunda, çözeltinin pH'sı mutlaka 5,0-5,5 aralığına ayarlanmalıdır. Bu pH aralığı yaprakdan besin maddesi absorpsiyonunun en yüksek olduğu değer aralığıdır. Bunun için, çözeltinin hazırlanmasında şu sıra izlenmelidir:

- Öncelikle, 100 litre suya 50-75 ml KalsiBalance gibi asidik çözelti ilave edilerek karıştırılır.
 - Ardından, yaprakdan uygulama için tavsiye edilen dozda NitroMax çözeltiye eklenir ve iyice karıştırılır.
 - Uygulama, güneş ışığının etkisinin düşük olduğu sabah erken veya akşam serin saatlerde yapılmalıdır.
- Bu yöntem, gübrelerin yaprakdan alım etkinliğini artırır ve bitkinin beslenmesini en üst düzeye çıkarır.

■ Toprakdan Uygulama Şekli

• **Damla Sulama Sistemi ile:** Tavsiye edilen toprakdan uygulama dozu, dekara 1 ton (1000 L) su ile verilmelidir. Özellikle fide sonrası ve hızlı vejetatif büyüme dönemlerinde uygulanmalıdır.

• **Pivot Sulama ile:** Tavsiye edilen toprakdan uygulama dozu esas alınarak dekara uygulanır. Kardeşlenme - sürgün gelişimi dönemlerinde tercih edilmelidir.

• **Yağmurlama ile:** Tavsiye edilen toprakdan uygulama dozu, dekara 600-800 L su ile uygulanmalıdır. Özellikle aktif vejetatif gelişim süresince uygulanmalıdır.

• **Sulama Altyapısı Bulunmayan Arazilerde:** Motopomp, sırt pülverizatörü, tanker veya sulama kanalı yardımıyla uygulanabilir. Traktör arkası ilaçlama makineleriyle, dekara tavsiye edilen uygulama dozu 80-100 L suya karıştırılarak arazi yüzeyine veya kök boğazına püskürtülerek uygulanabilir. Sulama öncesi veya sonrası doğrudan kök boğazına da verilebilir.

■ Seralarda Uygulama

• Serada Topraklı Yetiştiricilikte Kullanımı: Serada topraklı yapılan yetiştiriciliklerde toprakdan uygulanacak toplam miktar 2 kat artırımlı, kullanılması gereken miktar sulama sıklığı ve sayısına göre bölünerek uygulanmalıdır. Bitkinin fenolojik durumuna bağlı olarak yapılacak gübre değişikliklerinde, gübrenin tabloda verilen uygulama zamanının toplam vejetasyon süresi içerisindeki % payı dikkate alınarak toplam uygulanacak miktar azaltılmalıdır.

• Serada Topraksız Yetiştiricilikte (Hidroponik Sistem) Kullanımı: Serada substrat kültürü veya su kültürü gibi hidroponik sistemlerde toprakdan uygulanacak toplam miktar 3 kat artırımlı, besin çözeltisi konsantrasyonu dikkate alınarak, EC ve pH değerleri izlenmeli ve buna göre uygulama yapılmalı, kullanılması gereken miktar sulama sıklığı ve sayısına göre bölünerek uygulanmalıdır. Bitkinin fenolojik durumuna bağlı olarak yapılacak gübre değişikliklerinde, gübrenin tabloda verilen uygulama zamanının toplam vejetasyon süresi içerisindeki % payı dikkate alınarak toplam uygulanacak miktar azaltılmalıdır.



Organik Ürünler

Bitkisel Kökenli Sıvı Organik Gübre

OrganoPlantis OrganoSoil40

Garanti Edilen İçerik	%(w/v)
Organik Madde	40
Organik Karbon	16
Total Azot (N)	2
- Organik Azot	2
Suda Çözünbilir Potasyum Oksit (K ₂ O)	3
pH	4-6

FİRMA:  OrganoPlantis Organo Plantis MMC

Resid Behbudov 59, AF City Business Center, 7.kat 1726 No'lu ofis, Bakü Azərbaycan

info@organoplantis.com.tr

www.organoplantis.com

ÜRETİM YERİ:  Ecobigen Gübre, Tarım, Gıda Tic.San.Ltd.Şti.
Alparslan Mah. Samsun 1. Sok. No:13, Bafra, Samsun, Türkiye

Net Hacim: 1 litre

/ Kullanmadan önce çalkalayınız. /



KULLANIM AMACI / ÜRÜN TANIMI

Toprağın biyolojik aktivitesini artıran güçlü organik madde kaynağı.

OrganoPlantis OrganoSoil40, %40'a varan organik madde içeriğiyle toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştiren özel bir sıvı organik gübredir. İçeriğinde bulunan organik karbon, organik azot (N) ve potasyum (K), toprakta besin döngüsünü hızlandırır, mikrobiyal aktiviteyi artırır ve besin elementlerinin bitki tarafından daha etkin alınmasını sağlar. Düzenli kullanımda toprağın su tutma kapasitesi yükselir, toprak verimliliği artar ve ürün kalitesi iyileşir. Özellikle organik maddece fakir ve yorgun topraklarda en etkili çözümlerden biridir..

Bitki Grubu	Toprakdan Uygulama l / dekar	Yapraktan Uygulama ml / dekar	Uygulama Zamanı
Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik vb.)	45-50	450-500	Kardeşlenme ve sapa kalkma öncesinde 2 uygulama
Mısır, Ayçiçeği	45-50	450-500	Çıkış sonrası ve hızlı vejetatif büyüme döneminde 2 uygulama
Pamuk	45-50	450-500	Çıkış sonrası ve çiçeklenme öncesine kadar 2 uygulama
Patates, Havuç, Şeker Pancarı	40-45	400-450	Çıkış sonrası ve yumru/tuber oluşumu başlangıcında 2 uygulama
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Mercimek)	45-50	450-500	Çıkış sonrası ve hızlı gelişim döneminde 2 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Nar, Şeftali, Erik, Ayra, Kiraz vb.)	40-45	400-450	Sürgün gelişimi başında ve meyve tutumu öncesinde 2 uygulama
Muz, Zeytin	40-45	400-450	İlkbahar gelişiminde ve yaz ortasında 1-2 uygulama
Narenciye (Portakal, Mandalina, Limon vb.)	40-45	400-450	İlkbaharda sürgün gelişimi ve meyve tutumu öncesinde 1-2 uygulama
Sert Kabuklu Meyve Ağaçları (Fındık, Ceviz, Badem, Antep Fıstığı vb)	40-45	400-450	Çotanak bağlamadan önce ve iç doldurma döneminde 2 uygulama
Bağ, Kivi	35-40	350-400	İlkbaharda sürgün gelişimi ve yapraklanma döneminde 2 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hiyar, Kavun, Karpuz, Kabak vb)	40-45	400-450	Fide sonrası vejetatif gelişim süresince 2-3 uygulama
Yapraklı Yenen Sebzeler (Marul, Lahana, Ispanak vb.)	45-50	450-500	Fide gelişimi ve yaprak büyüme süresince 2 uygulama
Çilek	35-40	350-400	Fide dikiminden sonra kök gelişimi ve yapraklanma döneminde 2 uygulama
Yeşil Alanlar, Çim ve Kesme Çiçekçilik	45-50	450-500	Gelişim sezonu boyunca 15-20 günde bir uygulanır

10 dekar (da) = 1 hektar (ha)

* Toprakdan uygulanacak miktar uygulama sayısına bölünerek verilmelidir.

* Bitkinin fenolojik durumuna göre gübre değişikliği yapılması durumunda kullanılacak gübre miktarında 1/2 oranında azaltma yapılabilir.

Parti No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

