

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Toprak/Yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilmektedir.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alanlarda kullanınız.
- Uygulama esnasında maske, eldiven, gözlük takınız ve koruyucu elbise giymeniz önerilir.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar ile kullanmayıp imha ediniz.
- Güneşin etkisinin düşük olduğu sabah/akşam saatlerinde yapraktan uygulanması tavsiye edilir.

KARIŞILIRLIK

- Ürün, fizyolojik asit reaksiyonlu olan diğer ürünlerle ile birlikte güvenle karıştırılarak uygulanabilir.
- Ancak, bilinmeyen diğer preparatlar ile karışılabilirlikteki fiziksel uyumluluk için kavanoz testi ile yapılması önerilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI

- Ürün, orijinal ambalajında kapağı kapalı olarak +5 ile +25°C arasında, serin ve kuru alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürün, gıdalar, su kaynakları ve hayvan yemlerinden uzak, terchen ahşap ızgara üzerinde, iyi havalandırılan alanlarda depolanmalıdır.
- Bu koşullarda saklandığında, ürün 3 yıl süreyle fiziksel ve kimyasal özelliklerini korur.

FİRMA BEYANI

- Ürün, üretici firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürün kalitesini garanti eder.
- Gübrenin kullanımı üretici firmanın kontrolü dışında olduğu için, etiket üzerinde yer alan bilgiler yalnızca laboratuvar analiz sonuçları ile sınırlıdır.
- Hatalı kullanım, yanlış karışım veya uygun olmayan depolama koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar, üretici firmanın sorumluluğu dışındadır.

TAAHHÜT

- Piyasaya sunulan ürünün içeriği ve etiket bilgileri, alınan tescil belgelerindeki değerler ile aynıdır. Aksinin ispatı halinde, Türkiye Cumhuriyetinin 7223 sayılı kanun kapsamında tarafımıza uygulanacak yasal yaptırımları kabul ederiz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Yapraktan Uygulama:

OrganoPlantis AminoPower12, asidik reaksiyonlu bir gübredir. Ancak yapraktan uygulamalarda kullanılan suyun çok sert (kireçli) veya yüksek pH'lı olması durumunda, çözeltinin pH'sı mutlaka 5,0-5,5 aralığına ayarlanmalıdır. Bu pH aralığı yapraktan besin maddesi absorbsiyonunun en yüksek olduğu değer aralığıdır. Bunun için, çözeltinin hazırlanmasında şu sıra izlenmelidir:

- Öncelikle, 100 litre suya 50-75 ml KalsiBalance gibi asidik çözelti ilave edilerek karıştırılır.
- Ardından, yapraktan uygulama için tavsiye edilen dozda NitroMax çözeltiye eklenir ve iyice karıştırılır.
- Uygulama, güneş ışığının etkisinin düşük olduğu sabah erken veya akşam serin saatlerde yapılmalıdır.

Bu yöntem, gübrelere yapraktan alım etkinliğini artırır ve bitkinin beslenmesini en üst düzeye çıkarır.

Toprakdan Uygulama Şekli

- **Damla Sulama Sistemi ile:** Tavsiye edilen toprakdan uygulama dozu, dekara 1 ton (1000 L) su ile verilmelidir. Özellikle fide sonrası ve hızlı vejetatif büyüme dönemlerinde uygulanmalıdır.
- **Pivot Sulama ile:** Tavsiye edilen toprakdan uygulama dozu esas alınarak dekara uygulanır. Kardeşlenme – sürgün gelişimi dönemlerinde tercih edilmelidir.
- **Yağmurlama ile:** Tavsiye edilen toprakdan uygulama dozu, dekara 600-800 L su ile uygulanmalıdır. Özellikle aktif vejetatif gelişim süresince uygulanmalıdır.
- **Sulama Altyapısı Bulunmayan Alanlarda:** Motopomp, sırt pülverizatörü, tanker veya sulama kanalı yardımıyla uygulanabilir. Traktör arkası ilaçlama makineleriyle, dekara tavsiye edilen uygulama dozu 80-100 L suya karıştırılarak arazi yüzeyine veya kök boğazına püskürtülerek uygulanabilir. Sulama öncesi veya sonrası doğrudan kök boğazına da verilebilir.

Seralarda Uygulama

- Serada Topraklı Yetiştiricilikte Kullanımı: Serada topraklı yapılan yetiştiriciliklerde topraktan uygulanacak toplam miktar 2 kat arttırılmalı, kullanılması gereken miktar sulama sıklığı ve sayısına göre bölünerek uygulanmalıdır. Bitkinin fenolojik durumuna bağlı olarak yapılacak gübre değişikliklerinde, gübrenin tabloda verilen uygulama zamanının toplam vejetasyon süresi içerisindeki % payı dikkate alınarak toplam uygulanacak miktar azaltılmalıdır.
- Serada Topraksız Yetiştiricilikte (Hidroponik Sistem) Kullanımı: Serada substrat kültürü veya su kültürü gibi hidroponik sistemlerde topraktan uygulanacak toplam miktar 3 kat arttırılmalı, besin çözeltisi konsantrasyonu dikkate alınarak, EC ve pH değerleri izlenmeli ve buna göre uygulama yapılmalı, kullanılması gereken miktar sulama sıklığı ve sayısına göre bölünerek uygulanmalıdır. Bitkinin fenolojik durumuna bağlı olarak yapılacak gübre değişikliklerinde, gübrenin tabloda verilen uygulama zamanının toplam vejetasyon süresi içerisindeki % payı dikkate alınarak toplam uygulanacak miktar azaltılmalıdır.



Organik Ürünler

Hayvansal Kökenli Aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre

OrganoPlantis AminoPower12

Garanti Edilen İçerik	%(w/v)
Organik Madde	55
Organik Karbon	15
Toplam Aminoasitler	45
Serbest Aminoasitler	12
Toplam Azot (N)	7
- Organik Azot	7
pH	5-7


FİRMA:  OrganoPlantis MMC

Resid Behbudov 59, AF City Business Center, 7.kat 1726 No'lu ofis, Bakü Azərbaycan
info@organoplantis.com.tr www.organoplantis.com

ÜRETİM YERİ:  Ecobigen Gübre, Tarım, Gıda Tic.San.Ltd.Şti.
Alparslan Mah. Samsun 1. Sok. No:13, Bafra, Samsun, Türkiye

Net Hacim: 1litre

/ Kullanmadan önce çalkalayınız. /



KULLANIM AMACI / ÜRÜN TANIMI

OrganoPlantis AminoPower 12, %12 oranında hayvansal kökenli serbest amino asitler, yüksek organik madde, organik azot (N) ve potasyum (K) içeren özel bir sıvı organik gübredir. Amino asitler, bitkide protein sentezi, enzim aktivitesi ve enerji metabolizmasını hızlandırır. Bu sayede bitki gelişiminde canlılık sağlar, çiçeklenme ve meyve bağlama süreçlerini destekler. Özellikle stres koşullarında (kuraklık, sıcaklık, tuzluluk vb.) uygulandığında bitkinin hızlı toparlanmasına katkı verir ve ürünün verim ile kalitesini yükseltir.

Bitki Grubu	Toprakdan Uygulama l / dekar	Yapraktan Uygulama ml / dekar	Uygulama Zamanı
Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik vb.)	23 - 25	200-250	Kardeşlenme, sapa kalkma öncesi ve stres öncesi/sonrası 1-2 uygulama
Mısır, Ayçiçeği	23 - 25	200-250	Çıkış sonrası, dane doldurma öncesi ve stres öncesi/sonrası 1-2 uygulama
Pamuk	23 - 25	200-250	Çıkış sonrası, çiçeklenme öncesi ve stres öncesi/sonrası 2 uygulama
Patates, Havuç, Şeker Pancarı	23 - 25	200-250	Çıkış sonrası kök gelişimi, yumru/tuber oluşumu başlangıcı ve stres öncesi/sonrası 2 uygulama
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Mercimek)	20 - 22	150-200	Çıkış sonrası, çiçeklenme öncesinde ve stres öncesi/sonrası 1-2 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Nar, Şeftali, Erik, Ayva, Kiraz vb.)	23 - 25	200-250	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu başlangıcı ve stres öncesi/sonrası 2 uygulama
Muz, Zeytin	20 - 22	200-250	İlk bahar sürgün gelişimi, meyve tutumu öncesi ve stres öncesi/sonrası 1-2 uygulama
Narenciye (Portakal, Mandalina, Limon vb.)	23 - 25	200-250	İlk bahar sürgün gelişimi, çiçeklenme öncesi ve stres öncesi/sonrası 1-2 uygulama
Sert Kabuklu Meyve Ağaçları (Fındık, Çeviz, Badem, Antep Fıstığı vb.)	23 - 25	200-250	Çotanak bağlamadan önce, iç doldurma döneminde ve stres öncesi/sonrası 2 uygulama
Bağ, Kivi	23 - 25	200-250	Sürgün gelişimi, çiçeklenme öncesi ve stres öncesi/sonrası 1-2 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak vb.)	20 - 22	150-200	Fide sonrası, çiçeklenme ve meyve bağlama döneminde, ayrıca stres öncesi/sonrası 2-3 uygulama
Yapraklı Yenen Sebzeler (Marul, Lahana, Ispanak vb.)	20 - 22	150-200	Fide gelişimi, yaprak büyüme dönemi ve stres öncesi/sonrası 1-2 uygulama
Çilek	20 - 22	200-250	Fide dikiminden sonra kök gelişimi, çiçeklenme ve stres öncesi/sonrası 2 uygulama
Yeşil Alanlar, Çim ve Kesme Çiçekçilik	20 - 22t	150-200	Gelişim sezonu boyunca 15-20 günde bir, ayrıca stres öncesi/sonrası 1 uygulama

10 dekar (da) = 1 hektar (ha)
* Topraktan uygulanacak miktar uygulama sayısına bölünerek verilmelidir.
* Bitkinin fenolojik durumuna göre gübre değişikliği yapılması durumunda kullanılacak gübre miktarında 1/2 oranında azaltma yapılabilir.

Parti No: Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

