

UYARILAR

- Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- Toprak/Yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilmektedir.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alanlarda kullanınız.
- Uygulama esnasında maske, eldiven, gözlük takınız ve koruyucu elbise giymeniz önerilir.
- Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde bol su ile yıkayınız.
- Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar ile kullanmayıp imha ediniz.
- Güneşin etkisinin düşük olduğu sabah/akşam saatlerinde yapraktan uygulanması tavsiye edilir.

KARİŞİBİLİRLİK

- Ürün, fizyolojik asit reaksiyonlu olan diğer ürünlerle ile birlikte güvenle karıştırılarak uygulanabilir.
- Ancak, bilinmeyen diğer preparatlar ile karıştırılabilirliğindeki fiziksel uyumluluk için kavanoz testi ile yapılması önerilir.
- Kalsiyum içeren diğer bileşiklerle birlikte karıştırılarak uygulanmamalıdır.

DEPOLAMA KOŞULLARI

- Ürün, orijinal ambalajında kapağı kapalı olarak +5 ile +25°C arasında, serin ve kuru alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Ürün, gıdalar, su kaynakları ve hayvan yemlerinden uzak, tercihen ahşap ızgara üzerinde, iyi havalandırılan alanlarda depolanmalıdır.
- Bu koşullarda saklandığında, ürün 3 yıl süreyle fiziksel ve kimyasal özelliklerini korur.

FİRMA BEYANI

- Ürün, üretici firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürün kalitesini garanti eder.
- Gübrenin kullanımı üretici firmanın kontrolü dışında olduğu için, etiket üzerinde yer alan bilgiler yalnızca laboratuvar analiz sonuçları ile sınırlıdır.
- Hatalı kullanım, yanlış karışım veya uygun olmayan depolama koşullarından kaynaklanan olumsuzluklar, üretici firmanın sorumluluğu dışındadır.

TAAHHÜT

- Piyasaya sunulan ürünün içeriği ve etiket bilgileri, alınan tescil belgelerindeki değerler ile aynıdır. Aksinin ispatı halinde, Türkiye Cumhuriyetinin 7223 sayılı kanun kapsamında tarafımızca uygulanacak yasal yaptırımları kabul ederiz.

UYGULAMA ŞEKLİ

■ Yapraktan Uygulama:

OrganoPlantis UltraAmino, asidik reaksiyonlu bir gübredir. Ancak yapraktan uygulamalarda kullanılan suyun çok sert (kireçli) veya yüksek pH'lı olması durumunda, çözeltinin pH'sı mutlaka 5,0-5,5 aralığına ayarlanmalıdır. Bu pH aralığı yapraktan besin maddesi absorpsiyonunun en yüksek olduğu değer aralığıdır. Bunun için, çözeltinin hazırlanmasında şu sıra izlenmelidir:

- Öncelikle, 100 litre suya 50-75 ml KalsiBalance gibi asidik çözelti ilave edilerek karıştırılır.
- Ardından, yapraktan uygulama için tavsiye edilen dozda NitroMax çözeltiye eklenir ve iyice karıştırılır.
- Uygulama, güneş ışığının etkisinin düşük olduğu sabah erken veya akşam serin saatlerde yapılmalıdır.

Bu yöntem, gübrelere yapraktan alım etkinliğini artırır ve bitkinin beslenmesini en üst düzeye çıkarır.

■ Toprakdan Uygulama Şekli

- **Damlı Sulama Sistemi ile:** Tavsiye edilen toprakdan uygulama dozu, dekara 1 ton (1000 L) su ile verilmelidir. Özellikle fide sonrası ve hızlı jeveatif büyüme dönemlerinde uygulanmalıdır.
- **Pivot Sulama ile:** Tavsiye edilen toprakdan uygulama dozu esas alınarak dekara uygulanır. Kardeşlenme – sürgün gelişimi dönemlerinde tercih edilmelidir.
- **Yağmurlama ile:** Tavsiye edilen toprakdan uygulama dozu, dekara 600-800 L su ile uygulanmalıdır. Özellikle aktif jeveatif gelişim süresince uygulanmalıdır.
- **Sulama Altyapısı Bulunmayan Arazilerde:** Motopomp, sırt pülverizatörü, tanker veya sulama kanalı yardımıyla uygulanabilir. Traktör arkası ilaçlama makineleriyle, dekara tavsiye edilen uygulama dozu 80-100 L suya karıştırılarak arazi yüzeyine veya kök boğazına püskürtülerek uygulanabilir. Sulama öncesi veya sonrası doğrudan kök boğazına da verilebilir.

■ Seralarda Uygulama

- **Serada Topraklı Yetiştiricilikte Kullanımı:** Serada topraklı yapılan yetiştiriciliklerde topraktan uygulanacak toplam miktar 2 kat artırılmalı, kullanılması gereken miktar sulama sıklığı ve sayısına göre bölünerek uygulanmalıdır. Bitkinin fenolojik durumuna bağlı olarak yapılacak gübre değişikliklerinde, gübrenin tabloda verilen uygulama zamanının toplam jeveasyon süresi içerisindeki % payı dikkate alınarak toplam uygulanacak miktar azaltılmalıdır.
- **Serada Topraksız Yetiştiricilikte (Hidroponik Sistem) Kullanımı:** Serada substrat kültürü veya su kültürü gibi hidroponik sistemlerde topraktan uygulanacak toplam miktar 3 kat artırılmalı, besin çözeltisi konsantrasyonu dikkate alınarak, EC ve pH değerleri izlenmeli ve buna göre uygulama yapılmalı, kullanılması gereken miktar sulama sıklığı ve sayısına göre bölünerek uygulanmalıdır. Bitkinin fenolojik durumuna bağlı olarak yapılacak gübre değişikliklerinde, gübrenin tabloda verilen uygulama zamanının toplam jeveasyon süresi içerisindeki % payı dikkate alınarak toplam uygulanacak miktar azaltılmalıdır.



Organik Ürünler

Bitkisel Kökenli Aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre

OrganoPlantis UltraAmino

Garanti Edilen İçerik	%(w/v)
Organik Madde	25
Organik Karbon	10
Serbest Aminoasitler	10
Total Azot (N)	3
- Organik Azot	3
Suda Çözünbilir Potasyum Oksit (K ₂ O)	1
pH	4-6

FİRMA:  OrganoPlantis Organo Plantis MMC

Resid Behbudov 59, AF City Business Center, 7.kat 1726 No'lu ofis, Bakü Azərbaycan
info@organoplantis.com.tr www.organoplantis.com

ÜRETİM YERİ:  Ecobigen Gübre, Tarım, Gıda Tic.San.Ltd.Şti.

Alparslan Mah. Samsun 1. Sok. No:13, Bafra, Samsun, Türkiye

Net Hacim: 1 litre

/ Kullanmadan önce çalkalayınız. /



KULLANIM AMACI / ÜRÜN TANIMI

OrganoPlantis UltraAmino, yüksek oranda bitkisel kökenli serbest amino asitler, organik azot (N) ve potasyum (K) içeren güçlü bir sıvı organik gübredir. Bitkilerde protein sentezi, hormon üretimi ve enerji metabolizmasını doğrudan destekler. Özellikle stres koşullarında (kuraklık, yüksek sıcaklık, tuzluluk vb.) uygulandığında bitkinin hızlı toparlanmasını sağlar, büyüme kayıplarını en aza indirir. Düzenli kullanımda ürün verim ve kalitesini artırır.

Bitki Grubu	Toprakdan Uygulama l / dekar	Yapraktan Uygulama ml / dekar	Uygulama Zamanı
Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik vb.)	23 - 25	200-250	Kardeşlenme, sapa kalkma öncesi ve stres sonrası 1-2 uygulama
Mısır, Ayçiçeği	23 - 25	200-250	Çıkış sonrası, dane doldurma öncesi ve stres sonrası 1-2 uygulama
Pamuk	23 - 25	200-250	Çıkış sonrası, dane doldurma öncesi ve stres sonrası 1-2 uygulama
Patates, Havuç, Şeker Pancarı	23 - 25	200-250	Çıkış sonrası kök gelişimi, yumru/tuber oluşumu başlangıcı ve stres sonrası 2 uygulama
Baklagiller (Fasulye, Nohut, Mercimek)	20 - 22	150-200	Çıkış sonrası, çiçeklenme öncesi ve stres sonrası 1-2 uygulama
Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Nar, Şeftali, Erik, Ayva, Kiraz vb.)	23 - 25	200-250	Çiçeklenme öncesi, meyve tutumu başlangıcı ve stres sonrası 2 uygulama
Muz, Zeytin	20 - 22	200-250	İlk bahar sürgün gelişimi ve stres sonrası 1-2 uygulama
Narenciye (Portakal, Mandalina, Limon vb.)	23 - 25	200-250	İlk bahar sürgün gelişimi, çiçeklenme öncesi ve stres sonrası 1-2 uygulama
Sert Kabuklu Meyve Ağaçları (Fındık, Çeviz, Badem, Antep Fıstığı vb.)	23 - 25	200-250	Çotanak bağlamadan önce, iç doldurma döneminde ve stres sonrası 2 uygulama
Bağ, Kivi	23 - 25	200-250	Sürgün gelişimi başlangıcı, çiçeklenme öncesi ve stres sonrası 1-2 uygulama
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak vb.)	20 - 22	150-200	Fide sonrası, hızlı büyüme döneminde ve stres sonrası 2-3 uygulama
Yaprak Yenen Sebzeler (Marul, Lahana, Ispanak vb.)	20 - 22	150-200	Fide gelişimi, yaprak büyüme dönemi ve stres sonrası 1-2 uygulama
Çilek	20 - 22	200-250	Fide dikimi sonrası, çiçeklenme öncesi ve stres sonrası 2 uygulama
Yeşil Alanlar, Çim ve Kesme Çiçekçilik	20 - 22	150-200	Gelişim sezonu boyunca 15-20 günde bir, ayrıca stres sonrası 1 uygulama

10 dekar (da) = 1 hektar (ha)

* Topraktan uygulanacak miktar uygulama sayısına bölünerek verilmelidir.

* Bitkinin fenolojik durumuna göre gübre değişikliği yapılması durumunda kullanılacak gübre miktarında ½ oranında azaltma yapılabilir.

Parti No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

