

Özellikler

Gübre, fizyolojik ve kimyasal olarak bitki koruma ilaçları ile birleşik gübrelerle karıştırılarak uygulanabilir. Ancak, bilinmeyen diğer preparatlarla ile karıştırılmaması için fiziksel uyumluluğu kontrol edilmelidir. Uygulanması bitkinin erken safhalarında veya akşam üzeri yapılmalıdır. Gübrenin bitki yapraklarını ham altı, ham de üst yüzüne temas ettirmemeli, potasyumun soğuk suyun yaprak yüzeyinden akıp gitmemesi, sabit kalması için yayıcı yapıştırıcı kullanılması tavsiye edilir. Kalsiyum içeren diğer yaprak gübrelere birlikte kullanılmaması önerilmektedir.

Uyarılar

Toprak nemli ve yağmur sonrası yapılarak uygulanması tavsiye edilmektedir. Çocuklardan ve gıda ile temas eden hayvanlardan uzak tutunuz. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alanlarda kullanınız. Gübre uygulama sonrasında mısır, eldiven, giyimli aksesuar ve koruyucu elbise giyiniz. Göz, yüz ve deri ile temas etmeyiniz. Kullanılmış ürün boş ambalajları başka amaçlarla kullanılmayacağına emin olun.

Depolanma Şartları

Orijinal ambalajında ağzı kapalı normal şartlar altında muhafaza edilmiş durumda ürün 3 yıl süre ile ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki biterana sınırlı değerlerde bir değişiklik olmaz. Depolanma sıcaklığı +5 ile +35°C arasında olmalıdır ve ürün direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Serin ve kuru alanlarda, gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde, diğer zararlı maddelerle depolanması ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

Firma Beyanı

Üretici firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürün kalitesini garanti eder. Gübrenin kullanımını üretici firmasının kontrolü dışında olduğu için, ambalaj üzerinde verilen bilgilerle ilgili olarak, yanlış kullanım ve karıştırmaların dolaylı sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üretici firma garanti dışındadır. Hatalı kullanım ve depolanma şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Taahhüt

Phytosafe sunucularıma ürünün içeriği, etki ve etkisi ile ilgili belgesindeki bilgilerin aynı olduğunu taahhüt eder. Akarın ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak özasi işlemi kabul ederiz.

Net ağırlık: 1 kg
Bakanlık Lisans No: 2261 Bakanlık Tescil No: 2022TK3002
Parsel/Serisi No:
Üretim Tarihi:
Sarı Kullanma Talimatı, Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.



www.ecobigen.com.tr



EC FERTİLİZER
NPK Gübresi Harmanlanmış

AGROBİGEN - P 9-30-9+(2 MgO)+me

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Toplam Azot (N)	% 9
Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	% 3
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	% 5
Üre Azotu (CO(NH ₂) ₂)	% 1
Nötrül Amonyum Sulfat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 30
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 30
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 9
Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2
Suda çözünür Bor (B)	% 0,1
Suda çözünür Demir (Fe)	% 0,4
Suda çözünür Manganez (Mn)	% 0,4
Suda çözünür Çinko (Zn)	% 0,4

Ecobigen Gübre Tanım Cda Tic. San. Ltd. Şti.
Alparslan Mah. Samsun 1. Sok. No 13, Saha, Samsun / TÜRKİYE
Web: www.ecobigen.com.tr
E-posta: info@ecobigen.com.tr
Tel: +90 362 544 2102



1 kg



Suda hızlı çözünen ve bitki tarafından alımı kolay ve çabuk olan NANO TEKNOLOJİK GÜBRE



Ürün Özellikleri

Gübrenin tamamı suda çözünür formda olup, bitkilerimize güvenle uygulanabileceğimizi garanti ederiz.

Uygulama Dozu ve Zamanı

Tarımsal Edilen Uygulama Dozu: 250-750 gr/100 lt su içerisinde tamamen çözülerek yapıldıktan uygulanır. Kesin uygulama dozu, toprakta yapılacak gübreleme göre değişir. Toprakta P (Fosfor) gübrelenmesi için analizine göre tam olarak yapıldı ise 250 gr/100 lt P (Fosfor) gübrelenmesi her hasat öncesi için tam doz gübrelenme yapılmadı ise 750 gr/100lt kesin gübrelenme yapılmalı ise 500 gr/100 lttir. Üretimde.

Bitki	Uygulama Zamanı
Hububat (Arpa, Buğday, Çeltik vs)	Karotlenme döneminde uygulanır.
Meyve ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Sebze vs)	Pembe tomurcak döneminde itibaren 15-20 gün aralığı uygulanır.
Naranciyeye (Portakal, Mandalina, Limon vs)	Pembe tomurcak döneminde itibaren 15-20 gün aralığı uygulanır.
Fındık	Çekirdekleme öncesi dönemde uygulanır.
Pamuk	Fide ekiminden ve yapraçtan sonra uygulanır.
Mısır, Arpa vs	Bitki boyundan 15-20 cm olduğu dönemden itibaren 15 gün aralığı 2 defa uygulanır.
Çiçek	Fide ekiminden itibaren 15-20 gün aralığı uygulanır.
Şeker Pancarı, Pavlana, Fava vs	Çapadan sonra bitki tam örtüye geçince bir defa uygulanır.
Sebzeler	Bitkilerin 3-4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15-20 gün aralığı 2 defa uygulanır.
Diğer bitkiler	Bitkilerin akşam gelişme döneminden 15-20 gün aralığı uygulanır.