Öneriler

Gübre; fizyolojik asit reaksiyonlu olan bitki koruma ilaçları ile birlikte güvenle karıştırılarak uygulanabilir. Ancak, bilinmeyen diğer preparatlar ile karışabilirliğindeki fiziksel uygunluğa kavanoz testi ile karar vermek gereklidir. Uygulama sabahın erken saatlerinde veya akşam üzeri yapılmalıdır. Gübrenin, bitki yapraklarını hem alt, hem de üst yüzeylerine temesi sağlanmalı, püskürtülen solüsyonun yaprak yüzeyinden akıp gitmemesi sabit kalması için yayıcı yapıştırıcı kullanılması tavsiye edilir. Kalsiyum içeren diğer yaprak gübreleri birlikte karıştırılarak uygulanmamalıdır.

Uyarılar

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak uygulama yapılması tavsiye edilmektedir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alanlarda kullanınız. Gübre uygulama esnasında maske, eldiven, gözlük takınız ve koruyucu elbise giyiniz. Göz, yüz ve deriyi iyi yıkayınız. Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz.

Depolama Şartları

Orjinal ambalajında ağzı kapalı normal şartlar altında muhafaza edilmesi durumunda ürün 3 yıl süre ile ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki tolerans sınır değerlerinde bir değişiklik olmaz. Depolama sıcaklığı +5 ile +35°C arasında olmalıdır ve ürün direkt güneş ışığına maruz bırakmamalıdır. Serin ve kuru alanlarda, gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde, ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

Firma Beyanı

Üretici firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürün kalitesini garanti eder. Gübrenin kullanımı üretici firmanın kontrolü dışında olduğu için, ambalaj üzerinde verilen bilgiler analiz ile sınırlıdır. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan doleyi doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Taahhüt

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Net ağırlık: 1 kg
Bakanlık Lisans No: 2261 Bakanlık Tescil No: 2022TK3001
Parti/Seri No:
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

www.ecobigen.com.tr

AGROBİGEN

EC FERTILIZER
NPK Gübresi Harmanlanmış

AGROBİGEN - K

9-9-25+(2 MgO)+me

Garanti Edilen İçerik	% (W/W)
Toplam Azot (N)	% 9
Nitrat Azotu (NO_3-N)	% 7
Amonyum Azotu (NH_4-N)	% 1
Üre Azotu ($CO(NH_2)_2$)	% 1
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	% 9
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	% 9
Suda çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 25
Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2
Suda çözünür Bor (B)	% 0,1
Suda çözünür Demir (Fe)	% 0,4
Suda çözünür Mangan (Mn)	% 0,4
Suda çözünür Çinko (Zn)	% 0,4

Ecobigen Gübre Tarım Gıda Tic. San. Ltd. Şti.
Alparaslan Mah. Samsun 1. Sok. No:13, Bafra, Samsun / TÜRKİYE
Web: www.ecobigen.com.tr
E-posta: info@ecobigen.com.tr
Tel: +90 362 544 21 02

MADE IN TÜRKİYE

ECOBİGEN ÜRETİCİ FIRMA

1 kg



Suda hızlı çözünen ve bitki tarafından alımı kolay ve çabuk olan
NANO TEKNOLOJİK GÜBRE

AMİNOASİT ve MAGNEZYUM İÇERİKLİ
First Class
KLORSUZ

Ürün Özellikleri

Gübrenin tamamı suda çözünebilir formda olup, bitkilerinize güvenle uygulayabileceğiniz bir gübredir.

Uygulama Dozu ve Zamanı

Tavsiye Edilen Uygulama Dozu: 250-750 gr/100 lt su; içerisinde tamamen çözülerek yapraktan uygulanır. Kesin uygulama dozu, toprakları yapılan gübrelemeye göre seçilmelidir. Topraktan K (Potasyum)'lı gübreleme toprak analizine göre tam olarak yapıldı ise 250 gr/100 lt, K'lı gübrelerden her hangibirisi için tam doz gübreleme yapılmadı ise 750 gr/100 lt, kısmi gübreleme yapıldı ise 500 gr/100 lt doz uygulanmalıdır.

Bitki	Uygulama Zamanı
Hububat (Arpa, Buğday, Çeltik vs)	Sapa kalkma ve dane oluşum döneminde uygulama yapılır.
Meyve ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali vs)	Meyve tutum döneminde, meyve tutumu ve meyve büyüklüğünü teşvik etmek için 15-20 gün arayla uygulanır.
Narenciye (Portakal, Mandarin, Limon vs)	Çiçeklenme ve meyve gelişimi dönemlerinde 15 gün arayla uygulamalar tekrarlanır.
Fındık	Meyve oluşuktan sonra Mayıs - Temmuz ayları içerisinde 15-20 gün arayla uygulanır.
Pamuk	Çiçeklenme ve koza büyüme dönemlerinde 15 gün arayla uygulanır. İlk uygulama çiçeklenme başlangıcından 15 gün sonra yapılır. 4 uygulama yapılması önerilmektedir.
Mısır, Ayçiçeği	Bitki 50 cm boyundayken ve püskül oluşturma döneminde uygulanır.
Çilek	Çiçeklenme ve meyve gelişimi dönemi boyunca 15 gün arayla uygulanır.
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	Çiçeklenme ve yumru oluşumu başlangıcı dönemi boyunca 15-20 gün arayla 3-4 defa uygulanır.
Sebzeler	Çiçeklenme ve meyve gelişimi dönemi boyunca 15-20 gün arayla 3-4 defa uygulanır.
Diğer bitkiler	Bitkilerin meyve tutum döneminde 15-20 gün arayla birkaç sefer uygulanır.