

Özellikler

Gübre, fizyolojik aktif reaksiyonu olan bir kimyaya ilağın ile birlikte gübre ile karıştırılarak uygulanabilir. Ancak, bilinmeyen diğer preparatlar ile karıştırıldığındaki fiziksel uyumluluğu kavanoz testi ile kararı vermek gerektirir. Uygulama sebebindeki saadlerinde veya ağrıları için yapılmalıdır. Gübranın, biki yapraklarını hem alt, hem de üst yüzlerine teması sağlanırlı, püskürtülen solusyonun yaprak yüzünden akıp gitmemesi, sabit kalması için yayıcı yapıştıcı kullanılması tavsiye edilir. Kalsiyum içeren diğer yaprak gübreleri birlikte karıştırılarak uygulanmamalıdır.

Uyarılar

Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak uygulama yapılması tavsiye edilmektedir. Çiçeklerden ve gövdelerden uzak tutunuz. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alanlarda kullanınız. Gübre uygulama esnasında maske, eldiven, gözlük takınız ve konuyu elose giyiniz. Gaz, yut ve dani ile iyekiniz. Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

Depolama Şartları

Orijinal ambalajında ağrı kapalı normal şartlar altında muhafaza edilmesi durumunda ürün 3 yıl süre ile ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki bozulan amir değerlerinde bir değişiklik olmaz. Depolama sıcaklığı 15 ile 35°C arasında olmalıdır ve ürün direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Sıcak ve kuru alanlarda, gıda ve yiyeceklerle, su kaynaklarından uzak yerlerde, ağız kapakları üzerinde depolanmalı ve iltihabı havalandırma sağlanmalıdır.

Firma Beyanı

Üretici firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürün kalitesini garanti eder. Gübranın kullanımı Üretici firmamızın kontrolü dışında olduğu için, ambalaj üzerinde verilen bilgiler analiz ile sınırlıdır. Ancak hatalı kullanımı ve karışımlardan dolayı oluşabilecek olumsuzluklar firmamızın garantisidir. Hatalı kullanımı ve uygulamaları firmamızın kaynakları ile ilgili soruları kullanıcının sorumluluğundadır.

Taahhüt

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etkiyi bilgileri ile tesdi bölgesindeki çoğenen dnyo ilağını taahhüt eder, okının apeti halinde 4703 sayılı kanuna göre, haklarımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Net ağırlık: 1 kg
Bakım Licens No: 2261 Bekenlik Tesdi No: 2022TK3000
Pard/Sonlu:
Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.



www.ecobigen.com.tr



EC FERTİLİZER
NPK Gübresi Harmanlanmış

AGROBİGEN - D 17-17-17+me

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Toplam Azot (N)	% 17
Nitrat Azotu ($\text{NO}_3\text{-N}$)	% 7
Amonyum Azotu ($\text{NH}_4\text{-N}$)	% 3
Üre Azotu ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$)	% 7
Nötral Amonyum Sitrata ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	% 17
Suda çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	% 17
Suda çözünür Potasyum Oksit (K_2O)	% 17
Suda çözünür Bor (B)	% 0,1
Suda çözünür Demir (Fe)	% 0,2
Suda çözünür Mangan (Mn)	% 0,2
Suda çözünür Çinko (Zn)	% 0,2



Suda hızlı çözünen ve
bitki tarafından alımı kolay
ve çabuk olan
NANO TEKNOLOJİK GÜBRE



Ürün Özellikleri

Gübranın tamamı suda çözünür formda olup, bitkilerimize güvenli uygulanabileceği bir gübredir.

Uygulama Dozu ve Zamanı

Tavsiye Edilen Uygulama Dozu: 250-750 gr/100 lt su içerisinde tamamen çözülerek yapraklara uygulanır. Kışın uygulama dozu, toprakta yapılan gübrelere göre seçilmelidir. Toprakta N (Azot), P (Fosfor), K (Potasyum) gübrelere toprak analizi göre tem olarak yapılır. İse 250 gr/100 lt NPK gübrelere her hangi bir diğer tam doz gübrelere yapılmış İse 750 gr/100 lt, kısmi gübrelere yapıldı İse 500 gr/100 lt dozu önerilmektedir.

Bitki	Uygulama Zamanı
Hübsüz (Apa, Buğday, Çöğür vs)	Karadönme, sapa kalma ve dane oluşturma döneminde uygulama yapılır.
Maye ağaçları (Elma, Armut, Akç, Şeftali vs)	Foto kuluğu döneminde ve hasat sonrası 15-20 gün ara ile birkaç sefer uygulanır.
Meyve ağaçları (Portakal, Mandarın, Limon vs)	Çiçeklenme döneminden başlayarak hasat sonuna değin 15 gün arada uygulamalar yapılır.
Fındık	Döküm ve çiçeklenme döneminden hasat değin birkaç sefer uygulama yapılır.
Pamuk	Seyirleme döneminden sonra 15 gün arada birkaç sefer uygulama yapılır.
Unlu, Arpa vs	Yaprak gelişim dönemi boyunca 15-20 cm boyunda 15 gün arada uygulanır.
Çilek	Çiçekten tohumla geçimden 15 gün arada uygulama yapılır ve 15 gün sonra uygulama yapılır.
Bakır, Pancar, Patates, Havuç	Bakım gübre alımı için verilecek yaprak uygulaması ile tohumdan itibaren gelişme dönemi boyunca 15 günde bir uygulanır.
Sabunlar	Fide dikimden itibaren gelişme dönemi boyunca 15-20 gün arada 15-20 günde bir uygulanır.
Diğer bitkiler	Bakım gübre alımı için verilecek yaprak uygulaması ile tohumdan itibaren gelişme dönemi boyunca 15-20 gün arada birkaç sefer uygulanır.