

Öneriler

Gübre, fizyolojik asit reaksiyonlu olan bitki koruma ilaçları ile birlikte güvenli karıştırılarak uygulanabilir. Ancak, bilinmeyen diğer praperatlar ile karışa bilirdiğindeki fiziksel uygunluğa kavanoz testi ile karar vermek gereklidir. Uygulama sabahın erken saatlerinde veya akşam üzeri yapılmalıdır. Gübrenin, bitki yaprakların hem alt, hem de üst yüzeylerine teması sağlanmalı, püskürtülen solüsyonun yaprak yüzeyinden akıp gitmemesi, sabit kalması için yayıcı yapıştırıcı kullanılması tavsiye edilmektedir. Kalsiyum içeren diğer yaprak gübreleri birlikte karıştırılarak uygulanmamalıdır.

Uyarılar

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak uygulama yapılması tavsiye edilmektedir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli alanlarda kullanınız. Gübre uygulama esnasında maske, eldiven, gözlük takınız ve koruyucu elbise giyiniz. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde bol su ile yıkayınız. Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlar ile kullanmayıp imha ediniz.

Depolama Şartları

Orijinal ambalajında ağız kapalı normal şartlar altında muhafaza edilmesi durumunda ürün 3 yıl süre ile ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki tolerans sınır değerlerinde bir değişiklik olmaz. Depolama sıcaklığı +5 ile +35 0C arasında olmalıdır ve ürün direkt güneş ışığına maruz bırakmamalıdır. Serin ve kuru alanlarda, gıda ve yiyeceklerden, su kaynaklarından uzak yerlerde, ahşap izgaralar üzerinde depolanmalı ve iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

Firma Beyanı

Üretici firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürün kalitesini garanti eder. Gübrenin kullanımı üretici firmanın kontrolü dışında olduğu için, ambalaj üzerinde verilen bilgiler analiz ile sınırlıdır. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar kullanıcının sorumluluğundadır.

Taahhüt

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği, etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Net ağırlık: 1 kg

Bakanlık Lisans No: 2261 Bakanlık Tescil No:2023TK8289

Parti/Seri No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanıma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.



www.ecobigen.com.tr



EC FERTİLİZER
Mikro Besin Elementleri Karışımı

AGROBİGEN Micro Combi

Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat),
Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat),
Çinko (Zn-Sülfat)



MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

Garanti Edilen İçerik	% (w/w)
Suda Çözünür Bor (B)	% 2
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 1
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 6
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 7
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 8

ÜRETİCİ FIRMA: Ecobigen Gübre Tarım Gıda Tic. San. Ltd. Şti.
Aparaslan Mah. Samsun 1. Sok. No:13, Bafra, Samsun / TÜRKİYE
Web: www.ecobigen.com.tr
E-posta: info@ecobigen.com.tr
Tel: +90 362 544 2102



1 kg



Suda hızlı çözünen ve
bitki tarafından alımı kolay
ve çabuk olan
NANO TEKNOLOJİK GÜBRE



Ürün Tanımı

Bitkilerde mikro besin eksikliklerinin önleyici mikro bitki besin maddeleri karışımıdır.

Uygulama Dozu ve Zamanı

Tavsiye Edilen Uygulama Dozu: 200-300 gr/100 lt su içerisinde tamamen çözülerek yapraklardan uygulanır.

Bitki	Uygulama Zamanı
Hububat (Arpa, Buğday, Çeltik vs)	Kardeşlenme, sapa kalkma ve dane oluşum dönemlerinde uygulama yapılır.
Meyve ağaçları (Elma, Armut, Kiraz, Şeftali vs)	Farekulağı döneminde ve hasat sonrası 15- 20 gün arayla birkaç sefer uygulanır.
Geniş ağaçlar ve meyve bahçeleri (muz, zeytin vs)	Farekulağı döneminde ve hasat sonrası 15-20 gün arayla birkaç sefer uygulanır.
Narenciye (Portakal, Limon, Mandarin vs)	Çiçeklenme öncesinden başlayarak hasat sonuna değin 15 gün arayla uygulamalar tekrarlanır.
Fındık	Döllenme ve çotanak bağlama döneminden hasata değin birkaç seferde uygulama yapılır.
Pamuk	Seyreltme işleminden sonra 15 gün arayla birkaç sefer uygulama yapılır.
Mısır, Ayçiçeği	Yaprak gelişimi dönemi boyunca bitki 50 cm boyunda iken uygulanır.
Çilek	Çıktıktan ve/veya şaşırtmadan 15 gün sonra ilk uygulama yapılır ve 15 gün sonra uygulama tekrarlanır.
Şeker Pancarı, Patates, Havuç	Bitkilerin gübre alımına izin verecek yaprak büyüklüğüne erişmesinden itibaren gelişme dönemi boyunca 15 günde bir uygulanır
Sebzeler	Fide dikiminden itibaren gelişme dönemi boyunca 15-20 gün ara ile 3-4 defa uygulanır.
Diğer bitkiler	Bitkilerin gübre alımına izin verecek yaprak büyüklüğüne erişmesinden itibaren gelişme dönemi boyunca 15-20 gün arayla birkaç sefer uygulanır.

